

Patientenkarte zu Deferipron Lipomed 500 mg

Schwangerschaft, Fertilität, Stillzeit

Nehmen Sie Deferipron Lipomed nicht ein, wenn Sie schwanger sind, versuchen, schwanger zu werden, oder stillen. Deferipron Lipomed kann schwere Schädigungen des ungeborenen Kindes verursachen. Wenn Sie schwanger sind oder stillen während der Behandlung mit Deferipron Lipomed, informieren Sie Ihren Arzt und holen Sie unverzüglich medizinischen Rat ein.

Frauen im gebärfähigen Alter wird empfohlen, während der Behandlung mit Deferipron Lipomed und 6 Monate nach der letzten Dosis eine wirksame Verhütungsmethode anzuwenden. Männern wird empfohlen, während der Behandlung und 3 Monate nach der letzten Dosis eine wirksame Verhütungsmethode anzuwenden. Fragen Sie Ihren Arzt nach der für Sie am besten geeigneten Methode.

Untersuchung Ihres weißen Blutbildes unter Deferipron Lipomed

Es besteht die geringe Wahrscheinlichkeit, dass Sie unter der Einnahme von Deferipron Lipomed eine Agranulozytose entwickeln (sehr niedrige Anzahl weißer Blutzellen), was zu einer schweren Infektion führen kann. Obgleich Agranulozytose nur bei 1 bis 2 von 100 Patienten auftritt, ist es wichtig, dass Ihr Blut regelmäßig untersucht wird.

DEF-00.T.500.DE.202308

PATIENTENKARTE

Wichtige Sicherheitshinweise für Patienten, die Deferipron Lipomed einnehmen

Verschreibender Arzt

Tel.



www.lipomed.com/edumat-de

Stellen Sie Folgendes sicher:

1. Lassen Sie Ihr Blut im ersten Jahr der Behandlung mit Deferipron einmal wöchentlich und danach in den von Ihrem Arzt empfohlenen Abständen untersuchen.
2. Suchen Sie unverzüglich Ihren Arzt auf, wenn Sie Infektionssymptome wie Fieber, Halsschmerzen oder grippeartige Symptome verspüren. Ihre Anzahl weißer Blutkörperchen muss innerhalb von 24 Stunden überprüft werden, um eine potenzielle Agranulozytose festzustellen.